



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ГЕРБИОН® СИРОП ПЛЮЩА

Торговое название препарата: Гербион® сироп плюща

Действующее вещество (МНН): Плюща листьев экстракт сухой

Лекарственная форма: сироп

Состав:

активное вещество: сухой экстракт листьев плюща. 1 мл сиропа содержит 7 мг сухого экстракта листьев плюща (*Hedera helix L., folium*) (5–7,5:1).

Экстрагент: Этанол 30% (м/м).

вспомогательные вещества: сорбитол жидкий (не кристаллизованный) (E420), глицерол (E422), натрия бензоат (E211), лимонной кислоты моногидрат (E330), бальзам ароматический (состоит из пропиленгликоля, этанола, цитронеллы масла, цитраля, лимона масло, кориандра масло), вода очищенная.

Описание: Сироп желтовато-коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие небольшого осадка.

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающее средство.

Код АТХ: R05CA12.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща обыкновенного, содержащий комплекс биологически активных веществ (тритерпеновые сапонины), в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Фармакокинетика

Препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща обыкновенного, содержащий комплекс биологически активных веществ (тритерпеновые сапонины), в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению

Гербион® сироп плюща представляет собой лекарственный препарат растительного происхождения, который применяют в качестве отхаркивающего средства:

- при острых воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с усиленной секрецией слизи и затруднением дыхания;
- для облегчения симптомов обострения хронических воспалительных заболеваний бронхов.

Способ применения и дозы

Режим дозирования

Обычная доза для **взрослых и подростков в возрасте старше 12 лет** составляет по 5 - 7,5 мл сиропа 3 раза в день.

Применение у детей

Обычная доза для **детей в возрасте от 4 до 12 лет** составляет по 5 мл сиропа 3 раза в день.

Обычная доза для **детей в возрасте от 1 до 4 лет** составляет по 2,5 мл сиропа 3 раза в день.

Обычная доза для **младенцев до 1 года** составляет по 2,5 мл сиропа 2 раза в день.

Способ применения

Внутрь, независимо от приема пищи.

Принимайте сироп утром и в начале второй половины дня.

Дозирование препарата производится с помощью дозирующей пластиковой ложки.

В период лечения препаратом Гербион® сироп плюща рекомендуется употреблять достаточное количество воды или других не содержащих кофеин теплых напитков.

Продолжительность лечения зависит от характера и тяжести заболевания и обычно составляет 7 дней. Рекомендуется принимать препарат еще 2 – 3 дня после исчезновения клинических признаков заболевания.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, кожный зуд, диспноэ, анафилактические реакции). Сообщалось о нарушениях со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея (частота неизвестна).

В случае возникновения тяжелых нежелательных явлений, следует прекратить лечение препаратом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная чувствительность к растениям семейства аралиевых.

Лекарственные взаимодействия

Нет сообщений о лекарственном взаимодействии препарата Гербион® сироп плюща с другими лекарственными средствами.

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, т. к. это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания

Не следует принимать препарат Гербион® сироп плюща в дозах, превышающих рекомендованные в инструкции.

При заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся затрудненным дыханием, лихорадкой, длительным кашлем или мокротой с примесью крови, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Осторожность рекомендуется у пациентов с гастритом или язвой желудка.

При отсутствии эффекта на фоне лечения препаратом Гербион® сироп плюща в течение 7 дней или ухудшении состояния необходимо обратиться к врачу.

Дети

У детей в возрасте до 4 лет со стойким или периодическим кашлем до проведения терапии должен быть установлен диагноз.

Применение при беременности и в период лактации

Применение препарата Гербион® сироп плюща не рекомендуется во время беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием достаточных данных по применению сухого экстракта листьев плюща у беременных женщин и кормящих грудью матерей.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Не было отмечено влияния препарата Гербион® сироп плюща на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

Передозировка

Прием препарата в дозах, превышающих рекомендованные (превышение суточной дозы более чем в два раза), может вызвать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение. Лечение является симптоматическим.

Форма выпуска

По 150 мл сиропа во флаконе из темного стекла, закупоренного пластмассовой пробкой с рассекателем жидкости и пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия.

По 1 флакону с пластиковой мерной ложкой в картонной пачке вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C.

Сироп следует использовать в течении 3-х месяцев после вскрытия флакона.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место, Словения

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

Представительство «КРКА, д.д., Ново место» в Республике Узбекистан

100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Афросиаб, 14

Тел.: +99878 150 2828, +99878 150 2929, телефакс: +99878 150 1044