



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ГЕРБИОН® СИРОП ПЕРВОЦВЕТА

Торговое название препарата: Гербион® сироп первоцвета

Действующие вещества (МНН): Первоцвета и тимьяна экстракты

Лекарственная форма: сироп

Состав:

активные вещества: жидкий водный экстракт корней первоцвета и жидкий водный экстракт травы тимьяна обыкновенного.

5 мл сиропа (1 мерная ложка) содержат: 3,08 г жидкого водного экстракта смеси первоцвета корней (*Primula veris* L. или/и *Primula elatior* (L.) Hill, *radix*) и тимьяна травы (*Thymus vulgaris* L. или / и *Thymus zygis* L., *herba*), что эквивалентно 0,22 г – 0,51 г первоцвета корней и 0,62 г тимьяна травы;

Экстрагент: вода;

вспомогательные вещества: левоментол, сахароза и метилпарагидроксибензоат.

Описание: Сироп коричневого цвета со специфическим запахом и вкусом. Допускается наличие небольшого осадка, характерное для веществ природного происхождения.

Фармакотерапевтическая группа: Отхаркивающее средство.

Код АТХ: R05C

Фармакологические свойства

Препарат обладает отхаркивающим, противовоспалительным, противомикробным действием; способствует уменьшению вязкости мокроты и лучшему ее отхождению.

Показания к применению

Гербион® сироп первоцвета представляет собой лекарственный препарат растительного происхождения, который рекомендован для облегчения отхаркивания при:

- воспалительных заболеваниях дыхательных путей (бронхит, бронхолит, фарингит), сопровождающихся затрудненным отделением вязкой бронхиальной слизи;
- простудных заболеваниях и гриппе, сопровождающихся кашлем.

Способ применения и дозы

Рекомендованная доза у взрослых составляет по 2 мерных ложки сиропа 3 – 4 раза в день.

Применение у детей и подростков

Рекомендованная доза у взрослых и дети старше 16 лет составляет по 2 мерных ложки сиропа 3 - 4 раза в день.

У детей в возрасте 10 - 16 лет препарат следует применять в дозе по 1 - 2 мерных ложки сиропа 3 раза в день.

У детей в возрасте 4 - 10 лет препарат следует применять в дозе по 1 мерной ложке сиропа 3 раза в день.

Применение у детей младше 4 лет не рекомендовано.

Не употребляйте пищу или напитки сразу после приема препарата, поскольку они могут ускорить удаление препарата из слизистых оболочек полости рта и горла.

Во время приема сиропа рекомендуется употреблять достаточное количество теплой воды.

Если в период лечения улучшение не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Перед употреблением взбалтывать.

Побочные действия

Как и все лекарственные препараты, данный препарат может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

При применении препарата в рекомендованных дозах побочные эффекты не ожидаются. Неизвестно (частота встречаемости не может быть определена на основании доступных данных)

- *Нарушения со стороны иммунной системы*
аллергические реакции, реакция гиперчувствительности (в более тяжелых случаях сопровождающаяся зудом припухлость лица, языка и слизистых оболочек полости рта и горла, т.е. отек Квинке).
- *Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта*
проблемы с желудком, тошнота и рвота.

Сообщая о побочных эффектах, Вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности данного лекарственного препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к препаратам, содержащим активные вещества растений семейства первоцветных и семейства яснотковых; гастрит или язва желудка.

Лекарственные взаимодействия

Препарат Гербион® сироп первоцвета не следует применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

Особые указания

Гербион® сироп первоцвета содержит сахарозу и поэтому не рекомендован людям, страдающим сахарным диабетом.

При появлении одышки, лихорадки или гнойной мокроты следует обратиться за консультацией к врачу или фармацевту.

Специальная информация о вспомогательных веществах

В состав препарата Гербион® сироп первоцвета входит метилпарагидроксибензоат, поэтому в ряде случаев возможно развитие аллергических реакций (в том числе отороченных).

В состав препарата Гербион® сироп первоцвета входит сахароза, поэтому он противопоказан пациентам с дефицитом сахаразы/изомальтазы, непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

В 1 дозирующей ложке сиропа (5 мл) содержится 3,16 г сахарозы. При соблюдении рекомендаций по применению препарата, указанных в инструкции, пациент получает на прием от 1,58 г (½ дозирующей ложки – 2,5 мл, что соответствует 0,158 хлебным единицам) до 9,48 г (3 дозирующих ложки – 15 мл, что соответствует 0,948 хлебным единицам) сахарозы.

Применение при беременности и в период лактации

Сироп не следует применять во время беременности и в период грудного вскармливания, поскольку данные по безопасности применения во время беременности и в период грудного вскармливания ограничены.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Не было отмечено влияния препарата на способность к управлению транспортными средствами и работе с механизмами.

Передозировка

Сообщений о случаях передозировки препарата до настоящего времени не зарегистрировано.

В случае передозировки сапонинсодержащих препаратов возможны желудочно-кишечные расстройства, проявляющиеся тошнотой, рвотой, диареей.

Лечение: симптоматическое.

Форма выпуска

По 150 мл сиропа во флаконе из темного стекла, закупоренный пластмассовой пробкой с рассекателем жидкости и пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия.

По 1 флакону с пластиковой мерной ложкой в картонной пачке вместе с инструкцией по медицинскому применению.

Условия хранения

До вскрытия флакона:

Хранить при температуре не выше 25°C. Не хранить в холодильнике.

После вскрытия флакона:

Хранить при температуре не выше 25°C. Не хранить в холодильнике.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не следует применять после истечения срока годности.

Сироп следует использовать в течении 3-х месяцев после вскрытия флакона.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

КРКА, д.д., Ново место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново место

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

Представительство «КРКА, д.д., Ново место» в Республике Узбекистан

100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Афросиаб, 14

Тел.: +99878 150 2828, +99878 150 2929, телефакс: +99878 150 1044