

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПИКОВИТ® ФОРТЕ

Торговое название препарата: Пиковит® форте

Лекарственная форма: пастилки

Состав:

1 пастилка содержит:

активные вещества:

Витамин А концентрат, синтетический, масляная форма, (1,7 ММЕ/г)	2,94 мг
Холекальциферол концентрат, масляная форма, (1 ММЕ/г)	0,40 мг
Аскорбиновая кислота	60,00 мг
Тиамин мононитрат	1,50 мг
Рибофлавин	1,70 мг
Пиридоксин гидрохлорид	2,00 мг
Цианокобаламин 0,1 % в маннитоле	6,00 мг
Никотинамид	20,00 мг
Фолиевая кислота	0,40 мг
Кальция пантотенат	10,00 мг
Альфа-токоферола ацетат, 50 % гранулят	30,00 мг

вспомогательные вещества: маннитол, аспартам, ароматизатор мандарин, полисорбат 80, глицерол, касторовое масло, мальтитол жидкий (пересчет на сухое вещество), магния стеарат, Капол 600 Фарма, повидон, кремния диоксид коллоидный безводный, титана диоксид (E171), бетакаротен, мальтитол.

Описание: круглые, двояковыпуклые пастилки, оранжевого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: поливитамины.

Код АТХ: A11BA

Фармакологические свойства

Пастилки Пиковит® форте содержат 11 наиболее важных витаминов в количествах, соответствующих рекомендуемой суточной дозе для детей в возрасте от 7 лет и старше.

Фармакодинамика

Витамины группы В (В₁, В₂, В₆, В₁₂, пантотеновая кислота и никотинамид) участвуют в метаболизме углеводов, белков и жиров. Фолиевая кислота необходима для нормального синтеза, регенерации и функционирования клеток крови. Витамин А необходим для развития эпителиальных клеток и синтеза зрительного пигмента. Витамин D регулирует поступление кальция и способствует правильной минерализации костей и зубов. Витамин С способствует абсорбции железа и принимает участие во многих окислительно-восстановительных процессах в организме. Витамин Е является физиологическим антиоксидантом, который защищает мембраны клеток и поддерживает функцию клеток.

Пастилки Пиковит® форте содержат сахарозаменители малтитол, маннитол и аспартам, не вызывающие развитие кариеса.

Фармакокинетика

Водорастворимые витамины (витамины группы В, витамин С и биотин) хорошо всасываются в количествах, соответствующих суточным потребностям организма. Количества, превышающие уровень насыщения тканей, выводятся с мочой и в меньшей степени, с желчью. Регулярный прием этих витаминов важен для поддержания необходимых концентраций в тканях, так как они накапливаются в организме в ограниченных количествах.

После приема внутрь жирорастворимые витамины А и D хорошо всасываются в тонкой кишке в присутствии жиров. Полнота всасывания витамина Е меньше (25 – 85% дозы). Более высокие количества жирорастворимых витаминов накапливаются в печени и, поэтому, являются более токсичными, чем водорастворимые витамины.

Показания к применению

Пастилки Пиковит® форте рекомендуется принимать, когда существует повышенная потребность организма в витаминах и при недостаточном и несбалансированном питании.

К этим случаям относятся:

- переутомление и недостаточная концентрация внимания у детей школьного возраста;
- физическая нагрузка (в том числе занятия спортом);
- неполноценное и несбалансированное питание (сниженная сопротивляемость инфекциям);
- снижение или отсутствие аппетита;
- при лечении антибиотиками;
- сезонный недостаток свежих овощей и фруктов.

Способ применения и дозы

Пастилка Пиковита® форте остается во рту до полного рассасывания.

Детям в возрасте старше 7 лет рекомендуется принимать по 1 пастилке один раз в день после еды.

При снижении аппетита следует принимать Пиковит® форте в течение 2 месяцев, во всех других случаях следует принимать Пиковит® форте в течение 1 месяца 2 – 3 раза в год.

Побочное действие

Побочные эффекты, возникающие при лечении Пиковитом® форте, классифицируются в соответствующие группы по системам органов и в зависимости от частоты возникновения:

- очень частые ($\geq 1/10$),
- частые ($\geq 1/100$ до $< 1/10$),
- нечастые ($\geq 1/1000$ до $< 1/100$),
- редкие ($\geq 1/10000$ до $< 1/1000$),
- очень редкие ($< 1/10000$),
- не известно (частоту определить невозможно на основании имеющихся данных).

В пределах каждой группы побочные эффекты препарата представлены в порядке уменьшения значимости.

Нарушения со стороны кожи и подкожной клетчатки

- очень редкие: реакции гиперчувствительности (например, сыпь, зуд).

Нарушения со стороны пищеварительного тракта

- очень редкие: метеоризм, диарея, в частности при применении дозировок, значительно превышающих предписанные.

Нарушения со стороны иммунной системы

- не известно: анафилактические реакции.

При возникновении реакций гиперчувствительности необходимо прекратить лечение и обратиться к специалисту.

При возникновении тяжелых побочных реакций следует прекратить прием препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Гипервитаминоз А и D.

Лекарственные взаимодействия

Препарат содержит кальций и поэтому задерживает всасывание в кишечнике антибиотиков из группы тетрациклинов, а также антимикробных средств – производных фторхинолонов и холестерина.

Особые указания

Не рекомендуется давать Пиковит® форте детям в возрасте до 7 лет.

Дети и подростки в возрасте до 14 лет могут принимать этот продукт только по рекомендации врача или фармацевта.

Перед совместным применением с другими витаминными или витаминно-минеральными препаратами необходимо проконсультироваться со специалистом.

Пациенты с сахарным диабетом могут принимать Пиковит® форте, при этом следует помнить, что одна таблетка содержит около 0,8 г мальтитола. Для метаболизма мальтитола необходим инсулин, но благодаря медленному гидролизу и всасыванию в желудочно-кишечном тракте потребность в инсулине мала. Кроме того, энергетическая ценность мальтитола (10 кДж/г, или 2,4 ккал/г) значительно ниже, чем у сахарозы.

Пиковит® форте содержит мальтит и жидкий мальтит. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости фруктозы не рекомендовано принимать Пиковит форте.

В состав Пиковита® форте входит аспартам, содержащий фенилаланин, поэтому препарат не рекомендуется принимать пациентам с фенилкетонурией.

Большие дозы глицерола могут вызвать головную боль и желудочно-кишечные расстройства.

Применение при беременности и период лактации

Беременные женщины и кормящие матери могут принимать Пиковит® форте только после консультации с врачом или фармацевтом.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Пиковит® форте не влияет на способность управлять автомобилем или потенциально опасными механизмами

Передозировка

Вероятность возникновения передозировки Пиковитом® форте очень мала. Длительное применение препарата (более 1 месяца) в очень высоких дозах может вызывать гипервитаминоз А и D.

Длительное применение в высоких дозах может вызвать периферическую невропатию. Подсластители маннитол и мальтитол плохо абсорбируются в желудочно-кишечном тракте. В высоких дозировках они могут вызывать диарею и метеоризм. Слабительный эффект возникает при потреблении в сутки более 60 г мальтитола (75 пастилок Пиковит® форте) или более 10 г маннитола (75 пастилок Пиковит® форте).

Форма выпуска

15 пастилок в блистере из ПВХ/ПВДХ/ПВХ фольги и алюминиевой фольги. По 2, 3 или 4 блистера (по 15 пастилок) вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, в защищенном от влаги и света месте. Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

КРКА, д. д., Ново Место, Шмарьешка цеста 6, 8501 Ново Место, Словения

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

Представительство «КРКА, д.д., Ново место» в Республике Узбекистан

100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Афросиаб, 14

Тел.: +99871 150 2828, +99871 150 2929, телефакс: +99871 150 1044