



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПИКОВИТ®

Торговое название препарата: Пиковит®

Лекарственная форма: сироп

Состав:

5 мл (1 ложка) сиропа содержит:

активные вещества:

ретинола пальмитат 1,7 млн МЕ/г (витамин А)	900 МЕ
холекальциферол 1 млн МЕ/г (витамин D ₃)	100МЕ
аскорбиновая кислота (витамин С)	50,00 мг
тиамина гидрохлорид (витамин В ₁)	1,00 мг
рибофлавина натрия фосфат (витамин В ₂)	1,00 мг
пиридоксина гидрохлорид (витамин В ₆)	0,60 мг
цианокобаламин (витамин В ₁₂)	1,00 мкг
никотинамид (витамин РР)	5,00 мг
декспантенол (D – пантенол)	2,00 мг

вспомогательные вещества: агар, трагакант, сахароза, глюкоза жидкая, масла апельсинового ароматизатор, ароматизатор грейпфрутовый, ароматизатор апельсиновый, полисорбат 80, лимонной кислоты моногидрат, краситель (Ponceau 4R) (E124), натрия бензоат, вода очищенная.

Описание: густая вязкая жидкость от светло-желтого до коричневатого-оранжевого цвета с допустимым присутствием едва видимых включений. Имеет приятный запах и кисловатый вкус.

Фармакотерапевтическая группа: Витамины. Поливитамины.

Код АТХ: А11ВА.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Сироп Пиковит® содержит девять основных витаминов, которые принимают участие в регуляции многих биохимических процессов в организме. Эффекты витаминов в организме в основном физиологические, а не фармакодинамические. Они играют важную роль в поддержании жизненно важных функций и хорошего психофизического состояния.

Витамин А участвует в синтезе различных веществ (белков, липидов, мукополисахаридов) и обеспечивает нормальную функцию кожи, слизистых оболочек, а также органа зрения.

Витамин D₃ играет важную роль в поддержании баланса кальция и фосфора в организме. При его недостатке в костной ткани уменьшается содержания кальция (остеопороз).

Витамин В₁ нормализует деятельность сердца и способствует нормальному функционированию нервной системы.

Витамин В₂ способствует процессам регенерации тканей, в том числе клеток кожи.

Витамин В₆ способствует поддержанию структуры и функции костей, зубов, десен; оказывает влияние на эритропоэз, способствует нормальному функционированию нервной системы.

Витамин В₁₂ участвует в эритропоэзе, способствует нормальному функционированию нервной системы. Витамины группы В участвуют в образовании различных ферментов, которые регулируют обмен веществ в организме.

Витамин С участвует в окислении ряда биологически активных веществ, регуляции обмена в соединительной ткани, углеводного обмена, свертываемости крови и

регенерации тканей, стимулирует образование стероидных гормонов, нормализует проницаемость капилляров. Витамин С повышает устойчивость организма к инфекциям, снижает воспалительные реакции.

Витамин РР и Д-пантенол – коферменты, участвующие в метаболизме белка, при синтезе жирных кислот и холестерина, при продуцировании энергии и необходимы для нормального функционирования центральной нервной системы.

Фармакокинетика

Фармакокинетические данные относительно сиропа Пиковит® отсутствуют. Предназначения отдельных витаминов в организме известны и описаны в литературе.

Водорастворимые витамины (витамины группы В и С) очень хорошо абсорбируются в количествах, соответствующих суточным потребностям организма. Количества, превышающие уровень насыщения тканей, выводятся с мочой, и иногда с калом. Они накапливаются в организме только в ограниченных количествах, поэтому регулярный прием этих витаминов важен для поддержания необходимых концентраций в тканях.

После перорального приема жирорастворимые витамины А и D хорошо абсорбируются в тонком кишечнике в присутствии жиров. Более высокие количества жирорастворимых витаминов накапливаются в печени.

Показания к применению

Сироп Пиковит® предназначен для детей в качестве профилактического средства:

- при отсутствии аппетита;
- для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и простудным заболеваниям;
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- при недостаточном физическом развитии (отставании в росте);
- в качестве витаминного препарата в ежедневном рационе питания, особенно в зимний и весенний периоды;
- при повышенной физической и нервно-психической нагрузке у детей школьного возраста;
- в комплексной терапии при применении антибиотиков.

Способ применения и дозы

Сироп Пиковит® принимается внутрь.

Дети в возрасте от 1 до 3 лет: по 1 мерной ложке (5 мл) сиропа 2 раза в сутки.

Дети в возрасте от 4 до 6 лет: по 1 мерной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки.

Детям в возрасте от 7 до 14 лет: по 1 мерной ложке (5 мл) сиропа 3 раза, максимально - 4 раза в сутки.

Сироп можно давать с ложечки или смешивать с чаем, соком или фруктовым пюре. Не следует превышать рекомендованную суточную дозу.

При отсутствии аппетита сироп следует давать ежедневно в течение 1 месяца. Повторный курс приема через 1-3 месяца.

Побочные действия

Возможны реакции гиперчувствительности.

При появлении аллергических реакций следует прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к активным веществам или вспомогательным компонентам препарата
- гипервитаминоз А и D

Лекарственные взаимодействия

Взаимодействия неизвестны.

Особые указания

В случае появления реакции повышенной чувствительности, приём препарата следует отменить.

Перед одновременным применением с другими витаминами и витаминно-минеральными препаратами, следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом.

В связи с содержанием рибофлавина может возникнуть желтая окраска мочи. Этот эффект является безопасным.

Сироп Пиковит® не рекомендуется применять пациентам с сахарным диабетом, так как 5 мл сиропа (1 мерная ложка) содержит 3 г сахара.

Детям в возрасте до 1 года сироп можно давать только по рекомендации и под наблюдением врача.

Применение при беременности и период лактации

Беременные и кормящие женщины могут принимать витамины и минералы по рекомендации врача. Дозы витаминов в препарате Пиковит® сироп предназначен для детей.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

О влиянии препарата на способность управлять транспортными средствами и механизмами не сообщалось.

Препарат не оказывает влияния на двигательную функцию детей.

Специальная информация о некоторых ингредиентах

Пиковит® сироп содержит сахарозу, глюкозу и краситель Пунцовый 4R (Punceau 4R) (E124).

Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости фруктозы, мальабсорбции глюкозы/галактозы или дефицитом сахаразы-изомальтазы не следует назначать этот препарат.

Краситель Пунцовый 4R (Punceau 4R) (E124) может вызывать развитие аллергических реакций.

Передозировка

При рекомендуемых дозах интоксикация не ожидается.

Длительное применение в очень больших дозах может привести к гипervитаминозу А и Д, хотя риск развития передозировки минимальный.

Симптомами гипervитаминоза А после кратковременного применения больших доз витамина А являются боль в животе, анорексия, рвота, нарушение зрения, головная боль, неkoordinируемые движения и покраснение кожи. Длительное применение больших доз витамина А может вызывать истончение и зуд кожи, трещины на губах, воспаление конъюнктивы, повреждение глаз, боль в суставах, хроническую головную боль и многократную рвоту.

Симптомами гипervитаминоза D, которые могут возникать после применения больших доз витамина D, являются анорексия, потеря веса, усталость, дезориентация, рвота, запор или диарея, металлический привкус во рту, сухость слизистой оболочки полости рта и жажда.

Форма выпуска

По 150 мл сиропа во флаконе из темного стекла, закупоренном пластмассовой пробкой с контролем первого вскрытия.

По 1 флакону вместе с дозирующей ложкой и инструкцией по медицинскому применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С, в защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Сироп следует использовать в течение 2 месяцев после вскрытия флакона.

Не следует применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

КРКА, д.д. Ново место, Словения, Шмарьешка 6, 8501 Ново место, Словения

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

Представительство «КРКА, д.д., Ново место» в Республике Узбекистан

100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Афросиаб, 14

Тел.: +99871 150 2828, +99871 150 2929,

Телефакс: +99871 150 1044