

**ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ**  
**(Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата)**  
**Информация для пациента**  
**ПИКОВИТ® Сироп**

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для вас сведения.**

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочесть его еще раз.

Всегда принимайте препарат в точности с данным листком или рекомендациями лечащего врача или фармацевта.

Сохраните листок – вкладыш. Возможно Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

**СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША**

1. Что из себя представляет препарат **Пиковит®** сироп и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед тем, как начать принимать препарат **Пиковит®** сироп.
3. Применение препарата **Пиковит®** сироп
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Как хранить препарат **Пиковит®** сироп.
6. Содержимое упаковки и другие сведения.

**1. Что из себя представляет препарат Пиковит® сироп и для чего его применяют.**

Название вашего лекарства - Пиковит® сироп. Пиковит® сироп содержит комплекс витаминов. Витамины являются важными факторами метаболических процессов в организме, необходимы для нормального роста и развития, для поддержания и укрепления здоровья. Препарат Пиковит® сироп содержит Ретинола пальмитат (витамин А), Холекальциферол (витамин D3), Рибофлавина натрия фосфат (витамин B2), Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6), Тиамин гидрохлорид (витамин B1), Цианокобаламин (витамин B12), Аскорбиновая кислота (витамин С), Никотинамид (витамин РР), Декспантенол (Д-пантенол). Относится к группе лекарств, называемых Средства, влияющие на метаболические процессы. Поливитамины.

**Пиковит® сироп можно применять в качестве профилактического средства:**

- при отсутствии аппетита;
- для повышения сопротивляемости организма к инфекционным и простудным заболеваниям;
- в период выздоровления после перенесенных заболеваний;
- при недостаточном физическом развитии (отставании в росте)

- в качестве витаминного препарата в ежедневном рационе питания, особенно в зимний и весенний периоды
- при повышенной физической и нервно-психической нагрузке у детей школьного возраста;
- в комплексной терапии при применении антибиотиков.

## **2. Что Вам нужно знать, прежде чем начать прием Пиковит® сироп**

### **Не принимайте Пиковит® сироп:**

- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- Гипервитаминоз А и Д.

### **Особые указания и меры предосторожности**

**Будьте особенно осторожны при приеме препарата Пиковит® сироп в следующих случаях:**

- Если вы страдаете сахарным диабетом, Пиковит® эмульсия не рекомендуется, так как 5 мл эмульсии (1 дозирующая ложка) содержит 3 г сахара, суточная доза (от 10 мл до 20 мл) содержит от 6 до 12 г сахара.
- Возможное окрашивание мочи в желтый цвет совершенно безвредно и объясняется наличием в препарате рибофлавина.
- При развитии реакции повышенной чувствительности, препарат следует отменить.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед одновременным применением препарата Пиковит® сироп и других витаминов и витаминно-минеральных препаратов.

### **Дети:**

Не рекомендуется давать сироп Пиковит® детям в возрасте до 1 года.

### **Применение препарата Пиковит® сироп во время беременности и кормления грудью**

В период беременности и кормления грудью можно принимать витамины только после обязательной консультации с врачом. Дозы витаминов в сиропе адаптированы для детей.

### **Влияние препарата Пиковит® сироп на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами**

Нет сообщений относительно способности препарата влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Не оказывает влияния на моторику детей.

Пиковит® сироп содержит сахарозу и глюкозу, это надо учесть пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости фруктозы, мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицита сахаразы-изомальтазы не следует принимать это лекарство.

Пиковит® сироп содержит красный краситель 4R (E124), который может вызывать аллергические реакции.

### **Другие лекарственные препараты и Пиковит® сироп**

Витамин С усиливает действие и побочные эффекты антимикробных средств из группы сульфаниламидов (в том числе появление кристаллов в моче).

### **3. Как принимать Пиковит® сироп**

Всегда используйте данное лекарство в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или фармацевта. При появлении сомнений посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

#### **Рекомендуемая доза**

Препарат принимается внутрь. Перед употреблением сироп во флаконе следует хорошо взбалтывать.

Дети в возрасте от 1 до 3 лет: рекомендуется давать по 1 дозирующей или чайной ложке (5 мл) 2 раза в день.

Дети в возрасте от 4 до 6 лет: по 1 дозирующей или чайной ложке 3 раза в день.

Детям в возрасте от 7 до 14 лет: по 1 дозирующей или чайной ложке 3 – 4 раза в день.

Сироп можно давать с ложечки или смешивать с чаем, соком или фруктовым пюре.

При отсутствии аппетита сироп следует давать ежедневно в течение 1 месяца.

Повторный курс приема через 1 – 3 месяца или по рекомендации врача.

#### **Если Вы приняли дозу препарата Пиковит® сироп, которая превышает рекомендуемую**

При приеме в рекомендуемых дозах интоксикация маловероятна.

Длительный прием препарата в высоких дозах может привести к развитию гипервитаминоза А и Д, хотя вероятность передозировки сиропа незначительна.

#### **Если Вы забыли принять препарат**

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

При наличии вопросов по применению данного препарата, обратитесь к лечащему врачу или фармацевту.

#### **Если вы перестали принимать препарат**

### **4. Возможные нежелательные реакции**

Возможны аллергические реакции.

**При развитии реакции повышенной чувствительности, применение препарата необходимо прекратить и проконсультироваться с врачом или фармацевтом.**

#### **Сообщение о нежелательных реакциях**

Если у Вас наблюдаются какие-либо нежелательные реакции, сообщите об этом своему лечащему врачу или фармацевту.

### **5. Как хранить Пиковит® сироп**

Хранить при температуре не выше 25 °С, в защищенном от света месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 2 года.

Не применяйте данный лекарственный препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке после слова «Годен до: ». Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Не выбрасывайте какие-либо лекарственные средства в сточные воды или вместе с бытовыми отходами. Уточните у своего фармацевта, как утилизировать лекарственное средство, которое Вы больше не используете. Данные меры предосторожности помогут защитить окружающую среду.

## **6. Содержимое упаковки и прочие сведения**

### **Что содержит Пиковит® сироп**

Сироп:

Густая, вязкая жидкость, от светло желтого до коричневого - оранжевого цвета с цитрусовым ароматом и кислым вкусом. Допускаются заметные пятна.

5 мл (1 дозирующая ложка) сиропа содержит:

*Активные компоненты:*

Ретинола пальмитат (витамин А)	900 МЕ
Холекальциферол (витамин D3)	100 МЕ
Рибофлавина натрия фосфат (витамин B2)	1 мг
Пиридоксина гидрохлорид (витамин B6)	0,6 мг
Тиамина гидрохлорид (витамин B1)	1 мг
Цианокобаламин (витамин B12)	1 мкг
Аскорбиновая кислота (витамин C)	50 мг
Никотинамид (витамин PP)	5 мг
Декспантенол (Д-пантенол)	2 мг

*Вспомогательные вещества:* агар, трагакант, сахароза, жидкая глюкоза, корригент апельсиновое масло, корригент концентрат апельсина, корригент концентрат грейпфрута, полисорбат 80, лимонная кислота, красный краситель 4R (E124), натрия бензоат, очищенная вода.

### **Как выглядит Пиковит® сироп и содержимое упаковки**

Упаковка:

Флаконы темного стекла по 150 мл сиропа.

1 флакон в картонной коробке в комплекте с дозирующей ложкой 5 мл.

### **Держатель регистрационного удостоверения**

КРКА, д.д., Ново место,

Шмарьешка цеста, 6, 8501 Ново место, Словения

### **Производитель**

КРКА, д.д., Ново место,

Шмарьешка цеста, 6, 8501 Ново место, Словения

**Все претензии потребителей следует направлять представителю держателя регистрационного удостоверения**

**ДАТА ПЕРЕСМОТРА ДОКУМЕНТА**